

付表 - A.2.1 長周期波高の出現分布（留萌）

留萌

冬季: '01/12 ~ '02/ 2

波高階級 (cm)	4√ m0L30-60		4√ m0L60-300		4√ m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
1 - 5	229	21.2	53	4.9	2	0.2
5 - 10	222	20.6	324	30.0	208	19.3
10 - 20	2	0.2	77	7.1	242	22.4
20 - 50	0	0.0	0	0.0	2	0.2
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					626	58.0
全観測					1080	
平均値	5.0		7.8		10.6	

留萌

春季: '02/ 3 ~ '02/ 5

波高階級 (cm)	4√ m0L30-60		4√ m0L60-300		4√ m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	530	48.0	250	22.6	32	2.9
5 - 10	210	19.0	404	36.6	442	40.0
10 - 20	0	0.0	86	7.8	263	23.8
20 - 50	0	0.0	0	0.0	3	0.3
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					364	33.0
全観測					1104	
平均値	4.1		6.5		9.4	

留萌

夏季: '02/ 6 ~ '02/ 8

波高階級 (cm)	4√ m0L30-60		4√ m0L60-300		4√ m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	982	88.9	647	58.6	73	6.6
5 - 10	57	5.2	389	35.2	859	77.8
10 - 20	0	0.0	3	0.3	107	9.7
20 - 50	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					65	5.9
全観測					1104	
平均値	3.1		4.8		7.4	

留萌

秋季: '02/ 9 ~ '02/11

波高階級 (cm)	4√ m0L30-60		4√ m0L60-300		4√ m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	689	63.1	274	25.1	41	3.8
5 - 10	370	33.9	624	57.1	620	56.8
10 - 20	3	0.3	164	15.0	395	36.2
20 - 50	0	0.0	0	0.0	6	0.5
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					30	2.7
全観測					1092	
平均値	4.5		7.0		9.6	

留萌

通年: '02/ 1 ~ '02/12

波高階級 (cm)	4√ m0L30-60		4√ m0L60-300		4√ m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	1	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	2530	57.8	1229	28.1	148	3.4
5 - 10	1129	25.8	1972	45.0	2205	50.3
10 - 20	6	0.1	465	10.6	1300	29.7
20 - 50	0	0.0	0	0.0	13	0.3
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					714	16.3
全観測					4380	
平均値	4.2		6.6		9.3	