

付表-C.1.7 長周期波高の出現分布（酒田）

酒田 冬季：'06/12～'07/ 2

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	727	67.3	449	41.6	146	13.5
5 - 10	304	28.1	439	40.6	543	50.3
10 - 20	25	2.3	146	13.5	328	30.4
20 - 50	11	1.0	33	3.1	42	3.9
50 -	0	0.0	0	0.0	8	0.7
欠測					13	1.2
全観測					1080	
平均値	4.5		7.2		10.0	

酒田 春季：'07/ 3～'07/ 5

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	956	86.6	704	63.8	309	28.0
5 - 10	113	10.2	296	26.8	624	56.5
10 - 20	22	2.0	73	6.6	120	10.9
20 - 50	1	0.1	19	1.7	39	3.5
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠測					12	1.1
全観測					1104	
平均値	3.5		5.3		7.6	

酒田 夏季：'07/ 6～'07/ 8

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	2	0.2	1	0.1	0	0.0
1 - 5	1060	96.0	1001	90.7	675	61.1
5 - 10	9	0.8	66	6.0	387	35.1
10 - 20	0	0.0	3	0.3	9	0.8
20 - 50	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠測					33	3.0
全観測					1104	
平均値	2.3		3.2		4.8	

酒田 秋季：'07/ 9～'07/11

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	900	82.4	657	60.2	248	22.7
5 - 10	146	13.4	317	29.0	635	58.2
10 - 20	19	1.7	75	6.9	149	13.6
20 - 50	0	0.0	16	1.5	33	3.0
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠測					27	2.5
全観測					1092	
平均値	3.6		5.5		7.6	

酒田 通年：'07/ 1～'07/12

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	2	0.0	1	0.0	0	0.0
1 - 5	3674	83.9	2847	65.0	1394	31.8
5 - 10	545	12.4	1078	24.6	2231	50.9
10 - 20	67	1.5	307	7.0	547	12.5
20 - 50	12	0.3	67	1.5	120	2.7
50 -	0	0.0	0	0.0	8	0.2
欠測					80	1.8
全観測					4380	
平均値	3.4		5.3		7.4	