

付表-C.1.30 長周期波高の出現分布（苦小牧）

苦小牧 冬季：'06/12～'07/ 2

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	889	82.3	714	66.1	309	28.6
5 - 10	118	10.9	221	20.5	560	51.9
10 - 20	12	1.1	68	6.3	123	11.4
20 - 50	0	0.0	16	1.5	27	2.5
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠測					61	5.6
全観測					1080	
平均値		3.3		5.1		7.2

苦小牧 春季：'07/ 3～'07/ 5

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	834	75.5	573	51.9	169	15.3
5 - 10	198	17.9	351	31.8	639	57.9
10 - 20	2	0.2	107	9.7	216	19.6
20 - 50	0	0.0	3	0.3	10	0.9
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠測					70	6.3
全観測					1104	
平均値		3.7		5.7		7.9

苦小牧 夏季：'07/ 6～'07/ 8

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	875	79.3	679	61.5	54	4.9
5 - 10	108	9.8	267	24.2	720	65.2
10 - 20	0	0.0	35	3.2	198	17.9
20 - 50	0	0.0	2	0.2	11	1.0
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠測					121	11.0
全観測					1104	
平均値		3.4		4.9		8.3

苦小牧 秋季：'07/ 9～'07/11

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	779	71.3	461	42.2	67	6.1
5 - 10	191	17.5	393	36.0	655	60.0
10 - 20	3	0.3	112	10.3	230	21.1
20 - 50	0	0.0	7	0.6	21	1.9
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠測					119	10.9
全観測					1092	
平均値		3.9		6.2		8.8

苦小牧 通年：'07/ 1～'07/12

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	3394	77.5	2427	55.4	662	15.1
5 - 10	609	13.9	1241	28.3	2527	57.7
10 - 20	16	0.4	324	7.4	766	17.5
20 - 50	0	0.0	27	0.6	64	1.5
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠測					361	8.2
全観測					4380	
平均値		3.6		5.5		8.0